



**Nachkontrollschema Melanom**

Datum Primärexzision:..... Lokalisation: .....

Nachexzision: .....

Melanom-Typ: ..... Breslow: .....

Verlauf (Metastasen inkl. Operationen):

.....  
 .....  
 .....

Jahre Monate nach Operation oder Metastasen		Breslow < 1mm	Breslow ≥ 1mm und < 4mm	Breslow ≥ 4mm und St.n. LK-Meta.	Datum der Untersuchung	Therapie
Eingangsstaging		A, evtl. B	A, B, D	A, B, C, D		
1	3		A	A		
	6	(A)	A, (B)	A, C, D		
	9		A	A		
	12	A	A, B, D	A, B, D		
2	15		A	A		
	18	(A)	A, (B)	A, C, D		
	21		A	A		
	24	A	A, B, D	A, B, D		
3	27		A	A		
	30	(A)	A, (B)	A, C, D		
	33		A	A		
	36	A	A, B, D	A, B, D		
4	39					
	42	(A)	A	A, C		
	45					
	48	A	A, B, D	A, B, D		

A: Komplette Untersuchung der äusseren Haut einschliesslich Dermatoskopie von Nävuszellnävi. Palpation der Region des Primärtumors, der Lymphknotenregionen.

B: Sonographie locoregionäre Lymphknoten (Modifiziertes intermediate risk)

C: PET-Untersuchung evtl. MRI 2 NS

D: S-100 (Blutuntersuchung)



Jahre Monate nach Operation oder Metastasen	Breslow < 1mm	Breslow ≥ 1mm und < 4mm	Breslow ≥ 4mm und St.n. LK-Meta.	Datum der Untersuchung	Therapie
5	51				
	54	(A)	A	A, C	
	57				
	60	A	A, B, D	A, B, D	
6	63				
	66				
	69				
	72	A	A	A, D	
7	75				
	78				
	81				
	84	A	A	A, D	
8	87				
	90				
	93				
	96	A	A	A, D	
9	99				
	102				
	105				
	108	A	A	A, D	
10	111				
	114				
	117				
	120	A	A	A, D	

A: Komplette Untersuchung der äusseren Haut einschliesslich Dermatoskopie von Nävuszellnävi. Palpation der Region des Primärtumors, der Lymphknotenregionen.

B: Sonographie locoregionäre Lymphknoten (Modifiziertes intermediate risk)

C: PET-Untersuchung evtl. MRI 2 NS

D: S-100 (Blutuntersuchung)

überarbeitet 22.6.2017

